

El arazá se da en el clima cálido y húmedo de la Amazonia colombiana




Entre 18°C a 33°C




Humedad relativa mayor a 80%

El árbol se adapta fácilmente a suelos de tipo arenoso, ácidos, poco fértiles, con deficiencias de fósforo y magnesio con pH menor a 5.0. Además soporta inundaciones periódicas y cortas menores a 15 días

- Hacer podas de formación eliminando ramas bajas
- Podas de descope para limitar la altura del arbusto a los 2.5-3m
- Entresacar ramas torcidas, enfermas u orientadas hacia el centro del árbol



- El arbusto inicia producción entre los 14 y 18 meses, la cual va incrementando hasta los 5 años
- La cosecha se da cada dos o tres meses, 70 a 80 días luego del inicio de la floración
- La fructificación aumenta cuando la precipitación es abundante




Es importante recoger la fruta que ha caído al suelo y darle un manejo adecuado en compostaje para evitar proliferación de la mosca de la fruta

Se puede cosechar a partir del cambio de coloración de verde a amarillo (color verde mate, o color amarillo 10 a 25%)



El fruto es de consistencia blanda por lo que se debe evitar apilar mucha fruta pues esto ocasiona daños por aplastamiento entre frutas (Lo mejor es utilizar canastillas poco profundas)

- El fruto a partir de un 15% de coloración amarilla madurará completamente en tres a cinco días, dependiendo del clima
- El fruto 100% amarillo empezará a dañarse en uno o dos días
- De ser necesario, almacene en un lugar limpio, fresco y seco
- En refrigeración, la temperatura crítica es de 12°C



El arazá tiene sabor ácido y agradable aroma, Alto contenido de provitamina A, Buen contenido de minerales, carbohidratos y vitamina C.